

БУ ХМАО - Югра «Сургутская городская клиническая поликлиника №1»

Инфекции, передаваемые половым путем

Женская консультация

**г.Сургут
2025 год**



КАКИЕ ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАЮТСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ?

- ▶ Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (ИППП) – это группа инфекционных заболеваний, которые передаются в основном посредством полового контакта от больного человека к здоровому. К ИППП относят сифилис, гонорею, хламидийную и микоплазменную инфекцию, трихомониаз, герпетическую и папилломавирусную инфекцию половых органов.





Помимо этого, половым путем передается такая инфекция, как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий заболевание, называемое СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита). ВИЧ-инфекция – это хроническое, медленно прогрессирующее заболевание, которое поражает клетки иммунной системы. В результате ее работа угнетается, организм больного теряет возможность защищаться от разнообразных

бактериальных, грибковых и вирусных заболеваний, а также препятствовать развитию злокачественных опухолей (рака), что через некоторое время ведет к смерти больного.

Так же при половых контактах помимо ИППП, ВИЧ-инфекции передаются вирусные гепатиты В и С, а также некоторые другие заболевания (чесотка, лобковые вши, контагиозный моллюск). На сегодняшний день известно 30 заболеваний, которые могут передаваться половым путем.



Распространенность ИППП и ВИЧ-инфекции

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире более 340 миллионов мужчин и женщин в возрасте 15—49 лет заболевают ИППП, на земном шаре каждый шестой житель страдает какой-либо болезнью, передаваемой половым путем.

Взаимосвязь распространения ИППП и ВИЧ-инфекции

Некоторое время вопросы ВИЧ и ИППП рассматривались независимо друг от друга. В действительности же между распространением ВИЧ-инфекции и ИППП существует объективная взаимосвязь. Наличие у человека какой-либо ИППП в среднем в 3-4 и даже более раз увеличивает риск заражения ВИЧ. Особенно риск возрастает при наличии одновременно нескольких ИППП. Имеющиеся нарушения целостности слизистых половых органов в результате инфицирования ИППП являются открытыми входными воротами для вируса иммунодефицита.

Практикуя половые контакты без средств индивидуальной защиты, от одного и того же партнера одновременно можно заразиться несколькими инфекциями в том числе и ВИЧ.



**При
незащищенных
половых
контактах:**


- Без
использования
презерватива



Практикуя половые контакты без средств индивидуальной защиты, от одного и того же партнера одновременно можно заразиться несколькими инфекциями в том числе и ВИЧ.

Все инфекции, которые могут передаваться
при половых контактах, условно можно
разделить на


излечимые



гонорея,
сифилис,
трихомониаз,

и

неизлечимые.




ВИЧ-инфекция,
герпес половых органов



При несвоевременной диагностике или неадекватной терапии ИППП могут приобретать хроническое течение и стать в последствии причиной поражения других органов и систем: суставов при хламидиозе, сердечно-сосудистой и нервной системы при сифилисе, вызвать онкологические заболевания (рак шейки матки при заражении вирусами папилломы), а при ВИЧ-инфекции - привести к летальному исходу.

Источник заражения и пути распространения ИППП и ВИЧ-инфекции



Основным источником заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией является больной человек. Животные этими болезнями не болеют. Однако нередко источником может быть внешне здоровый человек – носитель инфекции. Путь передачи преимущественно половой

Следует понимать, что заразиться ИППП и ВИЧ-инфекцией нельзя при



Рукопожатиях



Использовании питьевого
фонтанчика



Воду в бассейне
или водоеме



Укусах насекомых.



Объятиях, дружеском
поцелуе



Поручни в общественном
транспорте



Через пищевые продукты

Профилактика ИППП и ВИЧ-инфекции



Зависит от внутренних моральных установок (ориентации на более позднее начало половой жизни;

Отказ от добрачных и внебрачных интимных отношений).

Безопасное сексуальное поведение включает в себя:

1. Отказ от раннего начала половой жизни;
2. Исключение случайных половых связей;
3. Сокращение числа половых партнеров и выбор одного наиболее надежного;
4. Использование средств индивидуальной профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции (презерватив);
5. В случае подозрения на ИППП, случайном половом контакте с сомнительным партнером нужно незамедлительное обращение в лечебное учреждение.

Спасибо за внимание!

